BIORESIST®

CERTIFICAT CAAE nºCP/13/IN/0005/10 FE-024-0005.

CARACTÉRISTIQUES:

BIORESIST, est un phytofortifiant formulé à base d'extrait du polymère de Poly-D-Glucosamine hydrolysé par voie enzymatique. Ces hydrolysés, de poids moléculaire distinct agissent comme des éliciteurs des mécanismes de défense des plantes.
BIORESIST, formule résultant d'une haute technologie qui exerce un effet stimulateur sur la croissance végétale, en favorisant l'enracinement, le développement rizosphérique des plantes et l'absorption de nutriments, grâce à l'origine et aux caractéristiques biologiques de ses composants. Il active le système de la résistance acquise (SAR) chez les plantes avec en conséquence l'induction de la formation d'importantes racines secondaires pour augmenter l'apport nutritif de la plante et faire face aux pathogènes transmis aussi bien à travers le sol ou par voie aérienne.
BIORESIST, améliore la capacité de résistance des plantes face à des conditions adverses aussi bien biotiques (pathogènes) qu'abiotiques (stress environnemental), en stimulant le système immunologique des propres molécules signaux qui activent différentes voies défensives de la plante en diminuant l'incidence des maladies dans les cultures traitées.
* Il réduit les ouvertures des stomates des feuilles, limitant ainsi la capacité d'accès des pathogènes à l'intérieur de la plante et augmente la production de composés phénoliques dans celle-ci.

BIORESIST, est un produit Naturel - Écologique et donc respectueux de l'environnement. C'est un produit indiqué pour l'application sur tout type de cultures voie foliaire et/ou au sol.

COMPOSITION:

Poly-D-Glucosamine* ..... 3% m/m
Densité ..... 1,07 g/cc
pH..... 4,2 (±0,5)

(*)Extrait de polymère hydrolysé par voie enzymatique

DOSE ET MODE D'EMPLOI:

Voie sol : 5l/Ha pour induire la résistance acquise (SAR) qui a pour conséquence la formation de racines secondaires. Réaliser 4 à 5 applications avec un minimum de 20-25 l/Ha et cycle.

Voie foliaire: 200-300 cc/Hl. (dépense maximale 3l/Ha, il est convenable de régler le pH entre 5-6.

Irrigation par égouttement: 2 - 5 litres/Ha, suivant la culture. Appliquer aux premiers stades phénologiques pour favoriser la stimulation radiculaire, la croissance de biomasse végétale et la santé de la culture. Répéter l'application après 15 jours. Sur les arbres fruitiers et les cultures arborescentes, il est recommandable d'effectuer une application à 5 litres/Ha en post-récolte, pour optimiser l'accumulation de réserves nutritionnelles et réduire dans la mesure du possible l'« alternance » productive.

Bain de racines, tubercules et stolons: Diluer BIORESIST dans une solution à 10% et submerger pendant 15 – 20 secondes.

Traitements de semences : 1,5 – 3 litres/100 kg de semence.

Pépinières: Diluer BIORESIST dans une solution à 1% et appliquer au lit d'ensemencement ou plateau.

OBSERVATIONS:

S2 Maintenir hors de portée des enfants
S13 Maintenir éloigné des aliments, boissons et fourrages.
S46 En cas d'ingestion, rendez vous immédiatement chez le médecin et montrez-lui l'étiquette ou l'emballage.